

Conferencia

Dr ROBERTO YUNES

“Esquizofrenia Infantil”

La esquizofrenia de inicio infantil es una enfermedad mental crónica.

Presenta un diagnóstico controvertido porque los síntomas son inespecíficos y pueden presentarse en otras enfermedades de la niñez. Por tal motivo es difícil llegar a un diagnóstico certero.

No se presenta como la esquizofrenia del adulto (delirios, alucinaciones, etc.), donde son más específicos sus síntomas.

En los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales solo se encuentra la esquizofrenia que aparece en sus distintas formas en la adolescencia y adultez.

No existe un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales para niños.

Esta enfermedad afecta al 1% de la población; 1 de cada 40.000 aparecen en la infancia, COS (Childhood Onset Schizophrenia).

Se comienza a hablar de Esquizofrenia infantil (Congreso Internacional de París, 1937).

Esquizofrenia infantil (DSM-II, CIE-8).

El DSM-IV, 1994, definía el autismo como “trastornos generalizados del desarrollo” (TGD).

2013, DSM-5 se lo agrupó dentro de Trastornos del Neurodesarrollo al Espectro Autista (antes TGD y sus subtipos) y separado Esquizofrenia.

El DSM-5 cataloga el espectro autista dentro de los trastornos del neurodesarrollo.

Sustituyó el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el TGD no especificado. El síndrome de Rett ya no forma parte de esta división.