

Mesa Adolescencia

ESRUBILSKY, Valentina

### **“Desorganización psicótica en la adolescencia”**

Las diferencias entre normalidad y patología en las conductas adolescentes deben ser pensadas dentro del contexto individual, familiar, social y cultural.

La adolescencia admite en terreno de lo normal conductas que en otro momento vital merecerían el calificativo de patológicas, así como a la vez es necesario tener en cuenta en esta etapa etárea el aumento de la prevalencia de muchos desórdenes mentales.

La patología adolescente se diferencia de la adulta en la flexibilidad, movilidad y en la evolución. En la elaboración del diagnóstico de las descompensaciones psicóticas se requiere cautela y plasticidad, por la necesidad del adolescente de jugar distintas identificaciones, a manera de desarrollo de la personalidad. Los síntomas psicóticos como delirios paranoides o alucinaciones pueden ser fenómenos transitorios de desequilibrio en la integridad psíquica que se parecen a los descriptos en los trastornos borderline ó psicóticos, y se pueden observar en los adolescentes asociados a la defensa frente a los conflictos evolutivos. Diferenciar las evoluciones psicóticas y su límite con las crisis del desarrollo.

El tiempo y el desempeño global del adolescente son fundamentales para la realización del diagnóstico, así como también considerar el resto de la sintomatología de la psicosis: incapacidad para distinguir la realidad de la fantasía, evaluación de la realidad deteriorada y creación de una nueva realidad.